

КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РОССИИ

ВОЗРАСТ НАИМЕНОВАНИЕ ПРИВИВКИ

12 часов Первая вакцинация - гепатит В

3-7 день Вакцинация - туберкулез (6)

1 мес. Вторая вакцинация - гепатит В

3 мес. Первая вакцинация -дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит

4,5 мес. Вторая вакцинация - дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит

6 мес. Третья вакцинация -дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит

Третья вакцинация - гепатит В

12 мес. Вакцинация - корь, эпидемический паротит, краснуха (5)

18 мес. Первая ревакцинация -дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит

20 мес. Вторая ревакцинация - полиомиелит

6 лет Вторая вакцинация - корь, эпидемический паротит, краснуха 5

7 лет Вторая ревакцинация - дифтерия и столбняк

Первая ревакцинация -туберкулез (3, 6)

13 лет Вакцинация против вирусного гепатита В

Вакцинация против краснухи (девочки)

Третья ревакцинация - дифтерия и столбняк

14 лет Ревакцинация -туберкулез (4, 6)

Третья ревакцинация - полиомиелит

Взрослые Ревакцинация - дифтерия и столбняк - каждые 10 лет после последней ревакцинации

Примечания:

1 Прививки в рамках Национального календаря проводятся вакцинами отечественного и зарубежного производства зарегистрированными и разрешенными к применению в установленном порядке.

2 Дети, родившиеся от матерей - носителей вируса гепатита В или болевших гепатитом В в 3-м триместре беременности, прививаются по схеме 0-1-2-12 мес.

- 3 Ревакцинируют детей, не инфицированных туберкулезом, с отрицательной р. Манту,
- 4 Ревакцинируют детей, не инфицированных туберкулезом, с отрицательной р Манту, не получивших прививку в 7 лет.
- 5 При отсутствии комбинированных вакцин прививки против кори, эпидемического паротита и краснухи проводят в один день разными шприцами в разные участки тела.
- 6 Все положенные по возрасту препараты, применяемые в рамках Национального календаря, можно вводить одновременно разными шприцами в разные участки тела Однако во избежание контаминации недопустимо совмещение в один день прививка против туберкулеза с другими парентеральными манипуляциями.
- (1) Эта вакцина предназначена для создания у людей активного искусственного иммунитета к туберкулезу. Вакцинация против туберкулеза производится на 3-7-й день жизни здоровым доношенным новорожденным, не имеющим противопоказаний.

В подготовке материала использована информация www.privivka.ru